

Hidroxicloroquina (Plaquenil®)


Indicación por FDA

Medicamento anti-reumático indicado para tratar el lupus eritematoso sistémico (LES) y la artritis reumatoide (AR).



Mecanismo de acción

Este medicamento tiene propiedades anti-inflamatorias y modula el sistema inmunitario, por lo que ayuda a controlar la AR y el LES.



Efectos adversos comunes

- Náuseas, vómitos, y malestar estomacal
- Dolor de cabeza
- Erupciones en la piel



Efectos adversos menos comunes pero serios:

- Oftálmicos (desorden de retina)
- Problemas cardiovasculares

Educación al Paciente

- Tome el medicamento con comida o un vaso de leche.
- Si toma un antiácido [ejemplos: famotidine (Pepcid®), omeprazole (Prilosec®), pantoprazole (Protonix®), entre otros], espera al menos 4 horas para tomar Plaquenil®.
- Reporte a su médico si siente pérdida de la visión o su visión no se adapta bien a la oscuridad.
- Siga las instrucciones de su médico y del farmacéutico para maximizar sus resultados con el uso de este medicamento.
- Este medicamento es seguro en el embarazo y la lactancia.

Dosificación y Administración

- Dosificación:
 - 200 mg -400 mg al día
- La dosis se ajusta por el peso del paciente.



Si estás en este tratamiento recuerde:

Visitar a su oftalmólogo anualmente.

Para evaluación de su retina.

Preparado por: Jorge L. Sánchez Rolón, PharmD, Nicole J. Almodóvar García, PharmD

Revisado por: Ileana Rodríguez Nazario, PharmD; Luis M. Vilá MD; Noelia Rodríguez, MD
Glorimar Bonilla Medina PharmDc

