

Micofenolato mofetil (CellCept®)

Indicación médica

Medicamento utilizado para tratar:

- Lupus eritematoso sistémico

Este medicamento también es utilizado para esclerodermia y otras condiciones autoinmunes.



Posibles Efectos Adversos

- Síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas y/o dolor abdominal
- Disminución en la hemoglobina y los glóbulos blancos
- Puede aumentar el riesgo de contraer infecciones



Mecanismo de Acción

Este medicamento suprime el sistema inmunitario, por lo que ayuda a controlar las condiciones reumáticas autoinmunes.



Dosificación y Administración

- Tomar 1-3 tabletas orales de 500 mg dos veces al día.
- Tomar las tabletas en ayuna, al menos 1 hora antes de comer para que el medicamento se absorba mejor.



Educación al Paciente

- Evitar el uso de antiácidos que contengan magnesio o aluminio hasta 2 horas luego de recibir una dosis del medicamento.
- Reporte a su médico si presenta algún efecto adverso y siga sus recomendaciones.
- Evite embarazos mientras esté tomando este medicamento. Si desea quedar embarazada, este medicamento debe ser discontinuado al menos 3 meses antes de concebir. Consulte con su reumatólogo para evaluar otras alternativas seguras para un posible embarazo.
- Vacunación: Detener el medicamento 4 semanas antes de la administración de una vacuna viva (ej. MMR). Esto no aplica a otro tipo de vacunas. Consulte con su médico antes de la administración de éstas.
- Cirugías: Detener el uso del medicamento 1 semana antes de cualquier cirugía electiva para evitar infecciones. Consulte con su médico antes de reiniciar la terapia.

Si estás en este tratamiento recuerde:

Reportar todo efecto adverso a su médico para evitar o tratar posibles complicaciones.

