



Prednisona


Indicación por FDA



Medicamento indicado para tratar desórdenes reumáticos autoinmunes tales como el lupus eritematoso sistémico y la artritis inflamatoria, entre otros.

Mecanismo de acción

Este medicamento tiene propiedades anti-inflamatorias y suprime el sistema inmunitario, por lo que ayuda a controlar las condiciones reumáticas autoinmunes.



Dosificación y Administración

- 2.5 mg - 80 mg diarios según la severidad de la condición, en forma de tabletas o solución oral

Posibles Efectos Adversos

- Corto Plazo
 - Aumento de la presión sanguínea
 - Aumento en los niveles de glucosa en sangre
 - Aumento en el apetito
 - Aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos
 - Problemas para dormir
 - Cambios en el estado de ánimo (depresión y/o ansiedad)



Posibles Efectos Adversos

- Largo Plazo
 - Aumento en el peso
 - Osteoporosis
 - Infarto en el hueso
 - Aumento en el riesgo de infecciones
 - Aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares
 - Dificultad para sanar las heridas (cicatrización)
 - Cataratas
 - Glaucoma

Educación al Paciente

- Tome este medicamento en la mañana (o según indicado) con comida o leche.
- Reporte a su médico si presenta algún efecto adverso y siga sus recomendaciones.
- No descontinúe el medicamento de forma abrupta sin consultarlo con su médico.
- Evite la ingesta de alcohol y el uso de cigarrillo con este medicamento.
- Consulte con su médico si puede administrarse las vacunas recomendadas mientras tome prednisona.

Preparado por: Laura M. Quiñones Latorre, PharmD

Revisado por: Ileana Rodríguez, PharmD

Luis M. Vilá, MD

Noelia Rodríguez, MD

Glorimar Bonilla Medina, PharmDc