



# Sulfasalazina

## (Azulfidine®)

### Indicación por FDA


Medicamento utilizado para tratar la artritis reumatoide.



Además, se utiliza para tratar la artritis reactiva.

### Mecanismo de acción

Este medicamento tiene propiedades anti-inflamatorias y modula el sistema inmunitario, por lo que ayuda a controlar la artritis.



### Dosificación y Administración

- Tabletas orales de 500mg
- Se toma de 1,000 mg a 2,000 mg por boca cada 12 hrs
- No exceder 4,000 mg diarios

### Posibles Efectos Adversos

- Alergias
- Erupciones en la piel
- Pérdida de apetito, dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea
- Anemia
- Infertilidad transitoria (mientras toma el medicamento) en los varones



### Educación al Paciente

- Tómese con comida.
- No corte, aplaste o mastique la tableta.
- Reporte a su médico si presenta algún efecto adverso y siga sus recomendaciones.
- Este medicamento puede hacer que la orina se torne de color anaranjado.
- No utilice este medicamento si:
  - Es alérgico a la sulfa
  - Padece de porfiria (enfermedad hereditaria caracterizada por una sensibilidad excesiva en la piel debido a la exposición a la luz)
- Este medicamento es seguro en el embarazo y la lactancia



Preparado por: Abraham J. Méndez Rivera, PharmD  
Revisado por: Ileana Rodríguez, PharmD  
Luis M. Vilá, MD  
Noelia Rodríguez, MD  
Glorimar Bonilla Medina, PharmDc